



Soyez toujours prudent et vigilant lorsque vous donnez un médicament à votre enfant. Voici quelques précautions à prendre et des conseils sur l'utilisation correcte des médicaments chez les enfants.



Comment ce médicament agit-il et dans quel cas est-il utilisé ?

Les médicaments contenant la substance active acétylcystéine sont des médicaments qui aident à fluidifier le mucus.

L'acétylcystéine peut être donné à votre enfant en cas de **toux grasse** (toux avec des glaires).



Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharmainfo.be).

Certaines formes ne conviennent pas aux enfants.

Consultez votre médecin et/ou pharmacien pour savoir quel médicament convient le mieux à votre enfant.

Cette liste contient tous les médicaments avec de l'acétylcystéine. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'acétylcystéine il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

La notice contient toutes les informations relatives à votre médicament, comme sa composition ou des informations sur les allergies.

Certains médicaments contiennent d'autres substances actives en plus de l'acétylcystéine. Ces médicaments sont mentionnés ailleurs. Effectuez une [nouvelle recherche](#) pour les trouver.



Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament mon enfant peut-il prendre ?

L'acétylcystéine peut être donné aux enfants à partir de 2 ans.

- Enfants de 2 à 7 ans :
 - Forme solide (granulés) : votre enfant ne doit pas prendre plus de 400 mg (milligrammes) par jour (24 heures), à répartir en 2 ou 3 prises.
 - Forme liquide : votre enfant ne doit pas prendre plus de 10 mL (millilitres) deux fois par jour (24 heures). **Il existe plusieurs sortes de sirops, utilisez la forme adaptée aux enfants.**
 - Ampoules pour aérosols : une ampoule par séance d'aérosol, 1 à 2 fois par jour pendant 5 à 10 jours.
- Enfants de plus de 7 ans :
 - Forme solide : votre enfant ne doit pas prendre plus de 600 mg (milligrammes) par jour (24

heures), à répartir en 1 à 3 prises.

- Forme liquide : votre enfant ne doit **pas prendre plus de 10 mL (millilitres) trois fois par jour, ou 30 mL en une seule prise** (24 heures).
- Ampoules pour aérosols : une ampoule par séance d'aérosol, 1 à 2 fois par jour pendant 5 à 10 jours.

À quel moment mon enfant doit-il prendre ce médicament ?

Vous pouvez donner l'acétylcystéine à votre enfant à **tout moment** de la journée, **avec ou sans nourriture**.

Si votre enfant prend de l'acétylcystéine plusieurs fois par jour, veillez à bien **répartir les prises** tout au long de la journée.

Pendant combien de temps mon enfant peut-il utiliser ce médicament ?

Donnez l'acétylcystéine **aussi brièvement que possible**. Une fois que les **symptômes** de toux ne sont plus gênants, **arrêtez** de donner de l'acétylcystéine.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'acétylcystéine sont les suivants :

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- maux de tête ;
- bruits et bourdonnements dans les oreilles (acouphène) ;
- fréquence cardiaque rapide ;
- augmentation du mucus ;
- nez qui coule ;
- vomissements ;
- nausées ;
- diarrhées ;
- douleurs abdominales ;
- inflammation de la bouche ;
- démangeaisons ;
- fièvre ;
- diminution de la tension artérielle.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant se plaint d'effets indésirables, même si ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#)



Mon enfant peut-il arrêter de prendre ce médicament ?

Oui, votre enfant peut arrêter de prendre de l'acétylcystéine. Il est conseillé d'arrêter le médicament dès que les symptômes ne sont plus gênants.



Que dois-je faire si mon enfant a oublié une dose ou pris trop de ce médicament ?

Que faire si mon enfant a oublié une dose ?

Donnez la dose suivante d'acétylcystéine à l'heure prévue.

Ne donnez **jamais** à votre enfant **une double dose** d'acétylcystéine pour compenser la dose oubliée.

Que faire si mon enfant a pris trop de ce médicament ?

Contactez immédiatement votre **médecin ou pharmacien** ou appelez le **Centre Antipoisons (070 245 245)**.

Votre enfant peut présenter les symptômes suivants : nausées, vomissements et diarrhées.



Mon enfant doit-il éviter certains aliments ou boissons lorsqu'il utilise ce médicament ?

Non, votre enfant peut manger et boire normalement pendant son traitement à l'acétylcystéine.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alimentation sur l'acétylcystéine.



À quoi dois-je faire attention si mon enfant prend d'autres médicaments ?

La prise de d'acétylcystéine peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments.

Aucune interaction potentiellement grave n'est connue pour l'acétylcystéine. La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



À quoi dois-je faire attention si mon enfant a d'autres problèmes de santé ?

Ne donnez pas d'acétylcystéine à votre enfant dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **ulcère** gastro-intestinal.

Pour la liste complète des situations qui demandent une vigilance particulière lorsque votre enfant prend de l'acétylcystéine, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ?
Contactez votre médecin ou votre pharmacien.