

Acide acétylsalicylique + Vitamine C (acide ascorbique))

Substance active

Important à savoir

- L'acide acétylsalicylique peut **augmenter le risque de saignement**.

Informations temporaires

Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant la substance active acide acétylsalicylique à dose élevée sont des **antidouleurs, des anti-inflammatoires et diminuent la fièvre**.

La vitamine C (acide ascorbique) joue un rôle dans l'immunité.

Prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C en cas de **douleurs, d'inflammation et de fièvre**

Acide acétylsalicylique + vitamine C peut être donné en cas de

- **douleurs ;**
- **inflammation ;**
- **fièvre.**

Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharmainfo.be).

Cette liste contient tous les médicaments avec d'acide acétylsalicylique + vitamine C. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'acide acétylsalicylique + vitamine C il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.

Certains médicaments contiennent d'autres substances actives en plus de l'acide acétylsalicylique + vitamine C. Ces médicaments sont mentionnés ailleurs. Effectuez une [nouvelle recherche](#) pour les trouver.

Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

Pour **connaître le dosage d'acide acétylsalicylique recommandé de façon générale**, consultez les documents [Acide acétylsalicylique contre la douleur, l'inflammation et la fièvre](#).

Vous **ne devez pas prendre plus de 4000 mg (milligrammes) (4 grammes) par jour** (24 heures), sauf si votre médecin vous l'a prescrit autrement. En cas d'inflammation, vous **ne devez pas prendre plus de 6 000 mg par jour (6 grammes)** (24 heures). Cette dose correspond à la dose maximale généralement recommandée chez l'adulte.

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Prenez l'acide acétylsalicylique + vitamine C **pendant ou juste après le repas** afin de diminuer les risques de troubles digestifs.

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour vous devez prendre de l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C **aussi brièvement que possible**. Une fois que les **symptômes** de douleur, d'inflammation et/ou de fièvre ont **disparu, arrêtez** de prendre de l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

Si, malgré la prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C, vous ressentez toujours les mêmes symptômes après 3 à 5 jours ou si les symptômes se sont aggravés, **prenez contact avec votre médecin**.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent :

- bruits et bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) ;
- respiration plus rapide et plus profonde ;
- allergie: gonflement du visage et des lèvres ou un urticaire (plaques rouges qui grattent) ;
- peau rouge avec des ampoules ;
- peau qui pèle, avec ou sans fièvre et douleurs articulaires ;
- saignements inhabituels.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C sont les suivants :

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- diarrhée (seulement en cas d'utilisation prolongée de doses élevées d'vitamine C).

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- ulcères dans l'estomac ou l'intestin ;
- saignement interne, sang dans les selles (selles noires ou avec du sang) ;
- urticaire (plaques rouges qui grattent) ;
- saignements plus fréquents, par exemple après l'extraction d'une dent ou pendant les règles ;
- nausées, maux de ventre, vomissements ;
- nez qui coule ;
- difficulté à respirer, surtout chez les patients asthmatiques.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).

Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Oui, vous pouvez arrêter de prendre de l'acide acétylsalicylique + vitamine C. Il est conseillé d'arrêter le médicament **dès que la douleur, l'inflammation et/ou la fièvre ont disparu**.

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez la dose suivante d'acide acétylsalicylique + vitamine C à l'heure prévue.

Ne prenez **jamais de double dose** d'acide acétylsalicylique + vitamine C pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245)**.

En cas de **surdosage d'acide acétylsalicylique**, vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- des vertiges ;
- des maux de tête et des bruits et bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) ;
- avoir l'impression d'entendre moins bien.

En cas de **surdosage grave**:

- vous pouvez avoir de la fièvre ;
- respirer plus rapidement et plus difficilement ;
- voir votre taux de glucose dans le sang chuter (vous vous sentirez alors fatigué(e) et vaseux(se)) ;
- tomber dans le coma.

Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser des machines si vous prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Non, il est préférable de ne pas consommer d'alcool si vous prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

L'alcool renforce l'effet irritant de l'acide acétylsalicylique, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez manger normalement lorsque vous prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alimentation sur l'acide acétylsalicylique + vitamine C.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaité ?

L'acide acétylsalicylique + vitamine C est **déconseillé** aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

Si vous êtes enceinte, **ne prenez pas d'acide acétylsalicylique + vitamine C sans avis médical**.

La prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C est **déconseillée pendant la grossesse**.

Prendre de fortes doses d'acide acétylsalicylique (plus de 500 mg par jour) pendant la grossesse, surtout sur une longue période, peut augmenter les risques de **fausse couche**, de **malformations** chez le bébé et de **complications** comme un accouchement plus long ou retardé.

Vous êtes enceinte ou vous essayez d'être enceinte, **discutez** de la prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C avec **votre médecin et/ou votre pharmacien**.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

La prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C est **déconseillée pendant l'allaitement** car le médicament peut provoquer des **effets indésirables** chez le bébé.

Si vous allaitez et que vous souhaitez prendre de l'acide acétylsalicylique + vitamine C, **discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien**.

À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise d'acide acétylsalicylique + vitamine C peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- les **anticoagulants** ;
- certains **anti-inflammatoires** ;
- certains médicaments utilisés en cas de **dépression et de troubles de l'humeur** ;
- le **méthotrexate** (médicament contre le cancer, le psoriasis ou les rhumatismes) ;
- le **vaccin contre la varicelle** ;
- l'**acétazolamide** (utilisé pour le traitement de l'hypertension dans les yeux et pour le traitement et la prévention du mal des montagnes) ;
- la **déféroxamine** (utilisée pour éliminer l'excès de fer et d'aluminium du corps).

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas d'acide acétylsalicylique + vitamine C dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- (antécédents de) **saignement gastro-intestinal** ;
- (antécédents d') **ulcère à l'estomac ou intestinal** ;
- **troubles de la coagulation** ;
- enfants de **moins de 12 ans** s'ils ont la grippe, la varicelle ou tout autre une **infection virale** ;
- **diminution du fonctionnement des reins** (insuffisance rénale) ;
- **diminution du fonctionnement du foie** (insuffisance hépatique) ;
- si vous devez subir une **opération** ou une intervention **dentaire**.

Pour la liste complète des situations qui demandent une vigilance particulière lorsque vous prenez de l'acide acétylsalicylique + vitamine C, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Conservez toujours ce médicament **hors de la portée et de la vue des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. **Rapportez-les à votre pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez **pas** ce médicament au-delà de sa date de péremption. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».



Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ?

Contactez votre médecin ou votre pharmacien.