Amoxicilline + Acide clavulanique pour enfants

Substance active

Important à savoir

- N'utilisez **pas** d'amoxicilline + acide clavulanique si votre enfant est **allergique à la pénicilline**.
- L'amoxicilline + acide clavulanique peut entraîner des **nausées** et de la **diarrhée**.
- Continuez de **donner** l'amoxicilline + acide clavulanique à votre enfant **aussi longtemps que votre médecin le recommande**, même si votre enfant se sent mieux avant la fin du traitement.

Informations temporaires

Soyez toujours prudent et vigilant lorsque vous administrez un médicament à votre enfant. Voici quelques précautions à prendre et des conseils sur l'utilisation correcte des médicaments chez les enfants.

Lorsque votre médecin vous prescrit des antibiotiques, il est important de suivre le traitement exactement comme indiqué. C'est la seule façon de vous assurer que toutes les bactéries sont bien détruites et de d'éviter l'apparition de bactéries résistantes. Ici vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation correcte des antibiotiques.

Comment ce médicament agit-il et dans quel cas est-il utilisé ?

Les médicaments contenant les substances actives amoxicilline + acide clavulanique sont des **antibiotiques.**

Votre médecin peut prescrire de l'amoxicilline + acide clavulanique à votre enfant en cas d'**infections** situées dans différentes parties du corps et causées par des **bactéries.** Une bactérie peut devenir **résistante** aux antibiotiques, ce qui les rend alors inefficace. **L'acide clavulanique** permet de ralentir ce processus, ce qui **permet à l'antibiotique de continuer d'agir plus longtemps.**

Les infections les plus courantes pour lesquelles votre médecin prescrit de l'amoxicilline + acide clavulanique sont les infections :

- des voies respiratoires inférieures ;
- des oreilles ;
- des sinus ;
- des voies urinaires ;
- des dents ;
- des articulations.

Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez PharmaInfo.be.

Certaines formes ne conviennent pas aux enfants.

Consultez votre médecin et/ou pharmacien pour savoir quel médicament convient le mieux à votre enfant.

Cette liste reprend tous les médicaments qui contiennent de l'amoxicilline + acide clavulanique. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'amoxicilline + acide clavulanique il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.

Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament mon enfant peut-il prendre ?

Consultez **l'étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose votre enfant doit prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que **le médecin a prescrit**. Si cette information ne figure pas sur l'étiquette et ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de **d'abord demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de **lire la notice**.

Le médecin déterminera la **dose a**daptée à votre enfant **en fonction** de son **poids et du type d'infection.**

Pour **connaître le dosage d'amoxicilline recommandé de façon générale**, consultez les documents Amoxicilline pour enfants.

Votre enfant ne peut **pas prendre plus de 100 mg (milligrammes) d'amoxicilline par kg (kilogramme) de poids corporel par jour** (24 heures), sauf si votre médecin en décide autrement. La dose maximale **ne doit jamais dépasser 1 g (gramme) à la fois** .

> *Exemple : le sirop contenant 250 mg d'amoxicilline et 62,5 mg d'acide clavulanique pour 5ml contient 50 mg d'amoxicilline par ml. Si votre enfant pèse 10 kg, vous pouvez lui donner maximum 1000 mg (ou 1 g) d'amoxicilline par jour. Cela correspond à maximum 20 ml (millilitres) de ce sirop par jour.*

À quel moment mon enfant doit-il prendre ce médicament ?

Donnez l'amoxicilline + acide clavulanique à votre enfant **pendant le repas ou juste après**, il aura ainsi moins de risques de troubles digestifs.

Consultez **l'étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour votre enfant doit prendre l'amoxicilline + acide clavulanique. Il faut toujours attendre au **moins 4 heures** entre deux prises.

Pendant combien de temps mon enfant peut-il utiliser ce médicament ?

Continuez à **donner** l'amoxicilline + acide clavulanique à votre enfant **aussi longtemps que votre médecin l'a dit**, même s'il se sent mieux avant la fin du traitement. Il est important de donner **toutes les doses prescrites** pour éliminer complètement l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut revenir.

Si, malgré la prise d'amoxicilline + acide clavulanique, votre enfant ressent toujours les mêmes symptômes, ou si les symptômes se sont aggravés, prenez contact avec **votre médecin**.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut également provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes d'une réaction allergique rare, mais pouvant être grave :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ;
- difficultés à respirer ;
- fièvre ;
- courbatures.

Arrêtz le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes de réactions cutanées rares, mais pouvant être graves :

- éruptions cutanées et démangeaisons ;
- petites tâches rouges sous la peau, comme des piqûres d'épingle ;
- bleus.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'amoxicilline + acide clavulanique sont les suivants :

Très fréquent (chez plus de 1 personne sur 10)

- diarrhée.

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- infection à levures dans les plis de la peau, le vagin ou la bouche (muguet) ;
- nausées et vomissements.

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- éruptions cutanées, démangeaisons ;
- bosses sur la peau accompagnées de démangeaisons ;
- vertiges et maux de têtes ;
- troubles digestifs.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Prenez contact avec votre médecin ou pharmacien si votre enfant subit des effets indésirables, même si ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS.

Mon enfant peut-il arrêter de prendre ce médicament ?

Non, votre enfant ne peut pas arrêter le traitement par amoxicilline + acide clavulanique sans avis médical.

Il est important de donner **toutes les doses prescrites** pour éliminer complètement l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut revenir.

Que dois-je faire si mon enfant a oublié une dose ou pris trop de ce médicament ?

Que faire si mon enfant a oublié une dose ?

Donnez la dose d'amoxicilline + acide clavulanique oubliée **dès que vous vous en apercevez**. **Attendez** au moins **4 heures** avant la dose suivante. **Contactez votre médecin** si vous avez **des questions** quant à la suite du traitement.

Ne donnez jamais à votre enfant **une double dose** d'amoxicilline + acide clavulanique pour compenser une dose oubliée.

Que faire si mon enfant a pris trop de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245)**.

Votre enfant peut présenter les symptômes suivants :

- nausées ;
- vomissements ;
- diarrhée ;
- crises d'épilepsie (convulsions).

Mon enfant doit-il éviter certains aliments ou boissons lorsqu'il utilise ce médicament ?

Non, votre enfant peut manger et boire normalement pendant son traitement par amoxicilline + acide clavulanique.

Il **n'y a pas d'effet connu** de l'alimentation sur l'amoxicilline + acide clavulanique.

À quoi dois-je faire attention si mon enfant prend d'autres médicaments ?

La prise d'amoxicilline + acide clavulanique peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Vous devez être prudent si votre enfant utilise l'amoxicilline + acide clavulanique en même temps que d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre

médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- **le méthotrexate**, un médicament utilisé dans les traitements contre le cancer, le psoriasis ou les rhumatismes ;
- **l'allopurinol**, un médicament utilisé pour traiter la goutte ;
- certains **anticoagulants**.

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

À quoi dois-je faire attention si mon enfant a d'autres problèmes de santé ?

Ne donnez pas d'amoxicilline + acide clavulanique à votre enfant dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **allergie** au **groupe des antibiotiques** dont l'amoxicilline fait partie (les pénicillines) ;
- **problèmes importants au foie** ;
- **problèmes importants aux reins** ou **difficultés à uriner** ;
- **hypertension** et/ou si vous devez suivre un **régime alimentaire pauvre en sel** : ne prenez pas les formes effervescentes.

Pour la liste complète des situations qui demandent une vigilance particulière lorsque votre enfant prend de l'amoxicilline, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Gardez toujours ce médicament **hors de la vue et de la portée des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Une **poudre pour suspension orale** doit d'abord être **préparée par le pharmacien**. Si vous souhaitez le faire vous-même, consultez la notice. Après préparation, la suspension doit être conservée au **réfrigérateur** (entre 2°C et 8°C).

Conservez toujours le médicament dans son **conditionnement d'origine bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas de médicaments dans l'évier ou les toilettes ni dans la poubelle. **Rapportez-les dans votre pharmacie**. Cliquez ici pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

Ne prenez **pas ce médicament au-delà de sa date d'expiration**. La date figure sur la boîte, le blister ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année, mentionné après « EXP ».

Certains **sirops** ont **une durée de conservation limitée après ouverture**. Consultez la notice pour en savoir plus.

Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ?
Contactez votre médecin ou votre pharmacien.