

Amoxicilline + Acide clavulanique

Substance active

Important à savoir

- Ne prenez **pas** d'amoxicilline + acide clavulanique si vous êtes **allergique aux pénicillines**.
- L'amoxicilline + acide clavulanique peut entraîner des **nausées** et de la **diarrhée**.
- Continuez à prendre votre amoxicilline + acide clavulanique **aussi longtemps que votre médecin le recommande**, même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement.

Informations temporaires

Lorsque votre médecin vous prescrit des antibiotiques, il est important de suivre le traitement exactement comme indiqué. C'est la seule façon de vous assurer que toutes les bactéries sont bien détruites et de d'éviter l'apparition de bactéries résistantes. [Ici](#) vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation correcte des antibiotiques.

Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant les substances actives amoxicilline + acide clavulanique sont des **antibiotiques**. Une bactérie peut devenir **résistante** aux antibiotiques, ce qui signifie que ces médicaments ne sont plus efficace contre elle. L'**acide clavulanique** permet de ralentir ou empêcher cette résistance.

Votre médecin peut vous prescrire de l'amoxicilline + acide clavulanique en cas d'**infections** situées dans différentes parties du corps et causées par des **bactéries**.

Les infections les plus courantes pour lesquelles l'amoxicilline + acide clavulanique sont prescrites sont les infections :

- des voies respiratoires inférieures ;
- des oreilles ;
- des sinus ;
- des voies urinaires ;
- des dents ;
- des articulations.

Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharma.info.be).

Cette liste reprend tous les médicaments qui contiennent de l'amoxicilline + acide clavulanique. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'amoxicilline et d'acide clavulanique il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

La notice contient toutes les informations relatives à votre médicament, comme sa composition ou des informations sur les allergies.

Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été

communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire **la notice**.

La posologie générale de l'amoxicilline se trouve dans les fiches [Amoxicilline](#) et [Amoxicilline pour enfants](#).

Vous ne **devez pas prendre plus de 6 g (grammes) d'amoxicilline par jour** (24 heures). Cette dose maximale s'applique à un adulte moyen.

Exemple : le sirop d'amoxicilline 250 mg + acide clavulanique 62,5 mg / 5 ml contient 50 mg d'amoxicilline par ml. Avec ce dosage, vous ne pouvez pas prendre plus de 120 ml par jour.

Pour connaître le dosage recommandé pour les enfants ou les personnes de moins de 40 kg, consultez le document [Amoxicilline + acide clavulanique pour enfants](#).

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Prenez de l'amoxicilline + acide clavulanique **pendant le repas ou juste après** afin de diminuer les risques de troubles digestifs.

Consultez **l'étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour vous devez prendre l'amoxicilline + acide clavulanique. Il faut toujours attendre au **moins 4 heures** entre deux prises.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Continuez à prendre votre amoxicilline + acide clavulanique **aussi longtemps que votre médecin vous l'a indiqué**, même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement. Il est important de prendre **toutes les doses prescrites** pour éliminer complètement l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut revenir.

Si, malgré la prise d'amoxicilline + acide clavulanique, vous ressentez toujours les mêmes symptômes, ou si les symptômes se sont aggravés, prenez contact avec **votre médecin**.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut également provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes d'une réaction allergique rare, mais pouvant être grave :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ;
- difficultés à respirer ;
- fièvre ;
- courbatures.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes de réactions cutanées rares, mais pouvant être graves :

- éruptions cutanées et démangeaisons ;
- taches rouges en forme de tête d'épingle sous la peau ;
- bleus.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'amoxicilline + acide clavulanique sont les suivants :

Très fréquent (chez plus de 1 personne sur 10)

- diarrhée.

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- infection à levures dans les plis de la peau, le vagin ou la bouche (muguet) ;
- nausées et vomissements.

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- éruptions cutanées, démangeaisons ;
- bosses sur la peau avec des démangeaisons ;
- vertiges et maux de têtes ;
- problèmes digestifs.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).

Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Non, vous ne pouvez pas arrêter le traitement par amoxicilline + acide clavulanique sans avis médical.

Vous avez **besoin de toutes les doses prescrites** pour combattre l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut réapparaître.

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez la dose d'amoxicilline + acide clavulanique oubliée **dès que vous vous en apercevez**. Attendez au moins **4 heures** avant la dose suivante. **Contactez votre médecin** si vous avez **des questions** quant à la suite du traitement.

Ne prenez **jamais de double dose** d'amoxicilline pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien** ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245).

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- des nausées ;
- envie de vomir ;
- de la diarrhée ;
- des crises d'épilepsie (attaque d'épilepsie, convulsions).

Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser une machine si vous prenez de l'amoxicilline + acide clavulanique, **sauf** si vous avez **des vertiges**.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez consommer de l'alcool si vous prenez de l'amoxicilline + acide clavulanique.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alcool sur l'amoxicilline + acide clavulanique.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez manger normalement pendant votre traitement à l'amoxicilline + acide clavulanique.

Il n'y a pas d'effet connu de l'alimentation sur l'amoxicilline + acide clavulanique.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaite ?

L'amoxicilline + acide clavulanique est sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

Oui, vous pouvez prendre de l'amoxicilline + acide clavulanique pendant la grossesse. Il n'y a pas d'effets négatifs connus.

Vous êtes enceinte ou vous essayez d'être enceinte ? Si c'est le cas, discutez de la prise d'amoxicilline + acide clavulanique avec votre médecin et/ou votre pharmacien.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez prendre de l'amoxicilline + acide clavulanique si vous allaitez. Il n'y a pas d'effets négatifs connus.

Si vous allaitez et que vous devez prendre de l'amoxicilline + acide clavulanique, discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien.

À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise d'amoxicilline + acide clavulanique peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les interactions potentiellement graves. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- le **méthotrexate**, un médicament utilisé dans les traitements contre le cancer, le psoriasis ou les rhumatismes ;
- l'**allopurinol**, un médicament utilisé pour traiter la goutte ;
- certains **anticoagulants**.

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas d'amoxicilline + acide clavulanique dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **allergie** au **groupe des antibiotiques** dont l'amoxicilline fait partie (les pénicillines) ;
- **problèmes au foie** graves ;
- **problèmes aux reins** graves ou **difficultés à uriner** ;
- **hypertension** et/ou si vous devez suivre un **régime alimentaire pauvre en sel** : ne prenez pas les formes effervescentes.

La liste complète des situations dans lesquelles vous devez être prudent(e) en cas de prise d'amoxicilline + acide clavulanique se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Gardez toujours ce médicament **hors de la vue et de la portée des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Rapportez-les à **votre pharmacie**. Cliquez [ici](#)

pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez pas ce médicament **au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ?

Contactez votre médecin ou votre pharmacien.