Amoxicilline

Substance active



Important à savoir

- Ne prenez pas d'amoxicilline si vous êtes allergique aux pénicillines.
- La prise d'amoxicilline peut entraîner des nausées et de la diarrhée.
- Continuez à prendre votre amoxicilline aussi longtemps que votre médecin le recommande, même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement.

Informations temporaires

Lorsque votre médecin vous prescrit des antibiotiques, il est important de suivre le traitement exactement comme indiqué. C'est la seule façon de vous assurer que toutes les bactéries sont bien détruites et de d'éviter l'apparition de bactéries résistantes. <u>Ici</u> vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation correcte des antibiotiques.

Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il?

Les médicaments contenant la substance active amoxicilline sont des antibiotiques.

Votre médecin peut vous prescrire de l'amoxicilline en cas d'infections situées dans différentes parties du corps et causées par des bactéries.

Les infections les plus courantes pour lesquelles l'amoxicilline est prescrite sont les infections :

- des voies respiratoires inférieures ;
- des oreilles;
- · des sinus.

L'amoxicilline peut aussi être utilisé pour traiter le maladie de Lyme ou dans le cadre d'un traitement combiné contre les ulcères de l'estomac.

Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez PharmaInfo.be.

Cette liste reprend tous les médicaments qui contiennent de l'amoxicilline. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'amoxicilline il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.

Certains médicaments contiennent d'autres substances actives en plus de l'amoxicilline. Ces médicaments sont mentionnés ailleurs. Effectuez une <u>nouvelle recherche</u> pour les trouver.

Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre?

Consultez l'étiquette du pharmacien pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le médecin a prescrit. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien ou de lire la notice.

Vous **ne devez pas prendre plus de 6 g (grammes) par jour** (24 heures). Cette dose correspond à la dose maximale généralement recommandée chez l'adulte.

Exemple: le sirop d'amoxicilline 500 mg/5 ml contient 100 mg d'amoxicilline par ml. Avec ce dosage, vous ne devez pas prendre plus de 60 ml de sirop par jour.

Pour connaître le dosage recommandé pour les enfants ou les personnes de moins de 40 kg, consultez le document Amoxicilline pour enfants.

À quel moment dois-je prendre ce médicament?

Vous pouvez prendre l'amoxicilline à n'importe quel moment de la journée, avec ou sans nourriture.

Prenez de l'amoxicilline pendant le repas ou juste après afin de diminuer les risques de troubles digestifs.

Consultez **l'étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour vous devez prendre l'amoxicilline. Il faut toujours attendre au **moins 4 heures** entre deux prises.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament?

Continuez à prendre votre amoxicilline **aussi longtemps que votre médecin vous l'a indiqué**, même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement. Il est important de prendre **toutes les doses prescrites** pour éliminer complètement l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut revenir.

Si, malgré la prise d'amoxicilline, vous ressentez toujours les mêmes symptômes, ou si les symptômes se sont aggravés, prenez contact avec **votre médecin**.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes d'une réaction allergique rare, mais pouvant être grave :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ;
- difficultés à respirer;
- fièvre;
- · courbatures.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes de réactions cutanées rares, mais pouvant être graves :

- démangeaisons ou irritations de la peau ;
- taches rouges et rondes sous la peau;
- bleus.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'amoxicilline sont les suivants :

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- éruptions cutanées ;
- nausées;
- diarrhée.

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

· vomissements.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? ». Cliquez ensuite sur

votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice Vous pouvez également signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS.

Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Non, vous ne pouvez pas arrêter le traitement par amoxicilline sans avis médical.

Il est important de prendre **toutes les doses prescrites** pour éliminer complètement l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut revenir.

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose?

Prenez la dose d'amoxicilline oubliée dès que vous vous en souvenez. Ensuite, attendez au moins 4 heures avant la dose suivante. Si vous avez des doutes sur la suite de traitement, contactez votre médecin.

Ne prenez jamais de double dose d'amoxicilline pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament?

Contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245).

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- nausées;
- envie de vomir;
- diarrhée;
- urine trouble:
- · difficultés à uriner.

Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser une machine si vous prenez de l'amoxicilline, sauf si vous avez des vertiges.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament?

Oui, vous pouvez consommer de l'alcool si vous prenez de l'amoxicilline.

Il n'y a pas d'effet connu de l'alcool sur l'amoxicilline.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament?

Oui, vous pouvez manger normalement pendant votre traitement à l'amoxicilline.

Il **n'y a pas d'effet connu** de l'alimentation sur l'amoxicilline.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaite?

L'amoxicilline est sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte?

Oui, vous pouvez prendre de l'amoxicilline pendant la grossesse. Il n'y a pas d'effets négatifs connus.

Vous êtes enceinte ou vous essayez d'être enceinte ? Si c'est le cas, discutez de la prise d'amoxicilline avec votre médecin et/ou votre pharmacien.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament?

Oui, vous pouvez prendre de l'amoxicilline si vous allaitez. Il n'y a pas d'effets négatifs connus.

Si vous allaitez et que vous devez prendre de l'amoxicilline, discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien.

À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments?

La prise d'amoxicilline peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- le méthotrexate, un médicament utilisé dans les traitements contre le cancer, le psoriasis ou les rhumatismes ;
- <u>l'allopurinol</u>, un médicament utilisé pour traiter la goutte ;
- · certains anticoagulants.

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « <u>Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?</u> ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé?

Ne prenez pas d'amoxicilline dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- allergie au groupe des antibiotiques dont l'amoxicilline fait partie (les pénicillines);
- problèmes graves aux reins ou difficultés à uriner ;
- hypertension et/ou si vous devez suivre un régime alimentaire pauvre en sel : ne prenez pas les formes effervescentes.

La liste complète des situations dans lesquelles vous devez être prudent(e) en cas de prise de l'amoxicilline se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : « <u>Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?</u> ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps?

Comment conserver ce médicament?

Conservez toujours ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservez ce médicament à température ambiante (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. **Rapportez-les à votre pharmacie**. Cliquez <u>ici</u> pour plus d'informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament?

N'utilisez pas ce médicament **au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».



Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.